



Aminoato de Zinc-Boro

Fertilizante orgánico-mineral quelatado

Líquido soluble

COMPOSICIÓN PORCENTUAL	% (P/V)
Ingredientes activos	
Zinc (Zn)	7.6 %
Boro (B)	1.2 %
L-Aminoácidos libres	6.0 %
Prolina	1.0 %
Ácido Gamma Aminobutírico	1.0 %
Ácidos Carboxílicos	25.0 %
Penetrantes, diluyentes y acondicionadores	58.2 %
Total	100 %

Contenido: 1L 5L 10L 20L

PUEDE SER NOCIVO EN CASO DE INGESTION
PUEDE SER NOCIVO POR EL CONTACTO CON LA PIEL

No. Lote:

Fecha de elaboración:

Fecha de caducidad: 2

años a partir de la fecha
de su elaboración

DISTRIBUIDOR: Tecno-Orgánica
Av. Independencia 270, Col. Los Llanitos
C.P. 63170, Tepic, Nayarit. Tel. 311 90 95 327

HECHO EN MÉXICO

ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

Use el equipo de protección personal adecuado para realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación y aplicación del producto. Los recipientes sellados pueden desarrollar presión, ábralos con cautela. Durante la preparación y aplicación del producto hágalo a favor del viento. Después de manejarlo o aplicarlo báñese, cámbiese de ropa y lave ésta, antes de volver a usarla.

- No coma, beba o fume cuando esté utilizando el producto.
- No se transporte ni almacene junto a productos alimenticios o ropa.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Lávese las manos después de utilizar el producto y antes de consumir alimentos.
- No se ingiera y evite el contacto del producto con los ojos y la piel.
- En caso de presentar molestias por el contacto con el producto, lleve a la persona con el médico.

PRIMEROS AUXILIOS

CONTACTO CON LOS OJOS

Lavar con agua corriente por un mínimo de 15 minutos

CONTACTO CON LA PIEL

Lavar el área contaminada con agua y jabón

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE

- Respete las recomendaciones de uso del producto.
- Maneje el envase vacío y los residuos del producto conforme a las disposiciones establecidas en su localidad.
- Respete las buenas prácticas agrícolas.
- No tire los envases o empaques vacíos del producto en suelos, ríos, lagos, lagunas u otros cuerpos de agua.
- No vierta el remanente del producto o agua de lavado del equipo de aplicación en suelos, ríos, lagos, lagunas u otros cuerpos de agua.
- Respete las dosis y época de aplicación del producto.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Almacene el producto en lugares frescos y cubiertos, no se deje al alcance de los niños ni se ponga en contacto con animales o alimentos.

FRUTZINC-B es un bionutriente elaborado a base de un complejo orgánico mineral de aminoato de zinc-boro, con aminoácidos libres de origen vegetal, enriquecido con bioestimulantes naturales como prolina y ácido gamma aminobutírico. **FRUTZINC-B** estimula el metabolismo de las plantas aumentando la síntesis de compuestos energéticos, por lo que promueve una reanudación vegetativa rápida, floración intensa y crecimiento de frutos.

CULTIVO	DOSIS (L/ha)	FRECUENCIA
Hortalizas en general (tomate, tomatillo, chile, berenjena, lechugas, coles, coliflor, brócoli, ajo, apio, frijol, haba, chícharo, garbanzo, cebolla, cebollín, cilantro, perejil, espárrago, etc.).	1-3	Realizar aplicaciones periódicas, por lo menos cada 14 días: <ul style="list-style-type: none"> • A los 10 días después del trasplante o emergencia. • Al inicio de floración. • Al inicio de llenado de fruto.
Fresa, frambuesa, zarzamora y arándano	1-3	Realizar aplicaciones periódicas, por lo menos cada 14 días:
Frutales (aguacate, cítricos, plátano, papaya, guayaba, mango, etc.).	2-4	<ul style="list-style-type: none"> • En desarrollo vegetativo. • Al inicio de floración. • Al inicio de llenado de fruto.
Ornamentales (rosas, crisantemo, clavel, nochebuena, gerbera, lillium, etc.).	1-3	Realizar aplicaciones periódicas, por lo menos cada 14 días: <ul style="list-style-type: none"> • En desarrollo vegetativo. • A los 14 días antes del botón o floración. • Al inicio del botón o floración.
Piña	1-3	Realizar aplicaciones periódicas, por lo menos cada 14 días: <ul style="list-style-type: none"> • A los 30 días de plantación. • A los 90 días después de plantación. • A los 150 días después de plantación
Cereales, leguminosas, caña de azúcar, café y algodón	1-3	Realizar aplicaciones periódicas, por lo menos cada 14 días: <ul style="list-style-type: none"> • A los 15 días después de la emergencia. • En desarrollo vegetativo. • Al inicio de floración y llenado.

FRUTZINC-B es un producto muy eficaz y confiable que rápidamente es absorbido y metabolizado por la planta. Debido a su contenido alto de bioestimulantes naturales, ayuda a desencadenar la estimulación del metabolismo de las plantas.

Efectos en la planta con la aplicación de **FRUTZINC-B**

- Incremento de la tasa fotosintética
- Apoya con los aminoácidos y péptidos necesarios, ahorrando la energía biológica
- Promueve la producción de brotes, flores y frutos
- Inducción de la actividad del crecimiento, que contribuye al aumento de tamaño de hojas, brotes y frutos
- Estimula floración y amarre de frutos
- Incrementa la actividad como cofactor de enzimas y participación en la producción de reguladores de crecimiento
- Contribuye a la rápida recuperación de las plantas afectadas por heladas u otros fenómenos meteorológicos
- Incremento en el rendimiento por el aumento de número de frutos por árbol

MÉTODO PARA APLICAR EL PRODUCTO

Antes de abrir el envase, agite vigorosamente, abra con cuidado el envase, mida la cantidad indicada y viértala en un recipiente conteniendo la mitad de su capacidad de agua limpia, agite y posteriormente agregue al tanque de aplicación. En aplicaciones foliares se recomienda aplicar en agua suficiente para cubrir totalmente el follaje. Cuando se aplica al suelo, tratar de que el agua moje perfectamente el área que cubre el sistema radicular.

INCOMPATIBILIDAD: FRUTZINC-B es compatible con la mayoría de los agroquímicos; sin embargo, se sugiere hacer pruebas antes de realizar la mezcla final.

GARANTÍA: Tecno-Orgánica garantiza la composición y el contenido neto del producto siempre y cuando el usuario adquiera el producto en su envase original cerrado. El fabricante no acepta responsabilidad por daños que puedan derivar del almacenamiento y aplicación inadecuados. El consumidor asume la responsabilidad de los resultados y riesgos derivados del uso y manejo del producto.